




**ENTE NAZIONALE  
DELLA  
CINOFILIA ITALIANA**

RICONOSCIUTO GIURIDICAMENTE CON R. DECRETO 13 GIUGNO 1940 N. 1051

**CERTIFICATO DI ISCRIZIONE**  
AL REGISTRO ORIGINI ITALIANO (R.O.I.)  
UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO  
ISTITUITO CON D.M.n.21095 del 5 FEBBRAIO 1996



IL DIRETTORE GENERALE  
RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE  
DEL LIBRO GENEALOGICO

FABRIZIO CRIVELLARI  
*Fabrizio Crivellari*







## ALTRE INFORMAZIONI

### Classificazione F.C.I. della displasia dell'anca:

- R = Grado A: nessun segno di displasia dell'anca;
- S = Grado B: articolazione dell'anca quasi normale;
- T = Grado C: leggera displasia dell'anca;
- U = Grado D: media displasia dell'anca;
- V = Grado E: grave displasia dell'anca.

### Classificazione F.C.I. - IEWG della displasia del gomito:

- W = Grado 0: non si riscontrano alterazioni;
- Z1 = Grado BL: (borderline, di transizione): alterazioni articolari minime;
- X = Grado 1: presenza di osteofiti di ampiezza < 2mm, e/o di sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare < 2mm;
- Y = Grado 2: presenza di osteofiti di ampiezza da 2 a 5mm e/o di grave sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare > 2mm; alterazioni del profilo del processo coronoideo mediale senza evidenza di frammentazione od una fusione incompleta del processo anconeale comportano comunque il grado 2;
- Z = Grado 3: presenza di osteofiti di ampiezza > 5mm; l'evidenza di un processo coronoideo mediale frammentato o di una lesione del profilo del condilo omerale mediale da osteocondrite dissecante (OCD) o da erosione (KL), o di una mancata unione del processo anconeale (UAP) comportano comunque il grado 3. Anche i cani sottoposti ad interventi chirurgici per displasia del gomito devono essere classificati come Grado 3 indipendentemente dal grado delle alterazioni articolari presenti, se l'intervento eseguito è dimostrabile radiograficamente.

Zuchttauglich

*Murken, ep. 0.19*  
*MCS*